



Estreptopen[®]

Mezcla de penicilinas y Estreptomicinas

REG. SAGARPA Q-2083-003

FORMULA:

Cada 1'000,000 U.I. contiene:

Penicilina G Procaína	375 000 U.I.
Penicilina G Sódica	125 000 U.I.
Penicilina G Dibencílica	500 000 U.I.
Estreptomicina (como sulfato de Estreptomicina)	375 mg
Dihidroestreptomicina (como sulfato de Dihidroestreptomicina)	375 mg

INDICACIONES

Combinación de:

- a) Penicilinas de corta y larga duración que actúan en contra de bacterias gram positivas y,
- b) Estreptomicina y Dihidroestreptomicina que actúan contra bacterias gram negativas lo que le confiere un amplio espectro de acción.

Está indicado en todas las especies como terapia inicial en diversas infecciones sistémicas. La combinación penicilina- estreptomicina es efectiva en diversas infecciones mixtas tale como infecciones del oído medio e infecciones del ombligo, así como enfermedades del aparato respiratorio.

La combinación penicilina-estreptomicina está indicada como complemento a otras terapias para combatir infecciones secundarias que acompañan comúnmente a la fiebre y mastitis. Debido a su amplio espectro de acción es útil en el tratamiento de infecciones en animales recién nacidos.

ESPECIES PARA LAS QUE SE RECOMIENDA EL PRODUCTO

Bovinos, Porcinos, Equinos y pequeñas especies.

DOSIS, VIA DE ADMINISTRACIÓN E INSTURCCIONES DE USO:

Aplicar de 11,000 a 22,000 U.I. por kilogramo de peso vivo. Mezclar perfectamente con el diluyente que acompaña. Administre mediante inyección intramuscular profunda solamente. Para mejores resultados:



- a) Recorte el pelo en el sitio de aplicación, lave con agua y jabón desinfecte con tinción de yodo, alcohol o algún otro germicida local.
- b) Use jeringas y agujas estériles. Use calibre 16 ó 18 para animales grandes y 19 ó 20 para animales pequeños.
- c) Mezcle perfectamente el polvo con el diluyente que se acompaña.
- d) Llene la jeringa con la cantidad de producto necesaria.
- e) Inserte la aguja en el sitio de inyección ejerza presión negativa para cerciorarse de que la aguja no esté en un vaso sanguíneo y entonces inyecte el producto en el músculo.

ADVERTENCIAS:

Pueden presentarse casos de hipersensibilidad en individuos alérgicos a la penicilina. En tal caso, el tratamiento debe ser discontinuado y el sujeto debe tratarse con los agentes usualmente utilizados (aminas vasopresoras, corticosteroides, y antihistamínicos).

No administrar en animales con historia de reacciones alérgicas o hipersensibilidad a las penicilinas o cefalosporinas o sus análogos.

Para evitar molestias posteriores a la aplicación se recomienda no administrar más de 10 ml en el mismo sitio de inyección.

Almacenar en un lugar fresco, protéjase de la luz solar.
Mantener fuera del alcance de los niños.

PERIODO DE RETIRO

No deberá usarse este producto 30 días antes del sacrificio de animales destinados para consumo humano.

No deberá usarse la leche de vacas tratadas hasta 72 horas después del tratamiento.

PRESENTACIONES:

Frascos con antibiótico en polvo de 2, 4, 6, 12 y 50 millones de U.I. con su diluyente respectivo.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.

Hecho en México por:

LAPISA, S.A. DE C.V.

Km. 5.5 Carr. La Piedad-Guadalajara

Tel +52 (352) 526-13-00 Fax +52 (352) 526-36-96

59300 La Piedad, Mich. México