

## COXIZURIL 2.5%

REG. SAGARPA Q-2083-155

Prevención y control de coccidiosis Oral

### FORMULA:

Cada ml contiene:

Toltrazuril	25 mg
Excipiente, c.b.p.	1 mL.

### INDICACIONES:

Esta indicado para la prevención y control de las infecciones causadas por coccidias que afectan a pollos, gallinas, gansos y pavos.

Coxizuril 2.5% esta formulado a base de Toltrazuril, un derivado del grupo químico de las traicionas sintéticas, uno de los anticoccidianos más modernos empleados a la fecha.

En pollos y gallinas actúa sobre las siguientes coccidias:

*Eimeria acervulina*  
*Eimeria brunetti*  
*Eimeria maxima*  
*Eimeria tenella*  
*Eimeria mivati*  
*Eimeria necatrix*

En gansos actúa contra las siguientes coccidias:

*Eimeria anseris*  
*Eimeria truncata*

En pavos actúa contra las siguientes coccidias:

*Eimeria adenoides*  
*Eimeria meleagridis*  
*Eimeria meleagrimitis*



### MODO DE ACCIÓN:

Toltrazuril induce cambios durante la etapa del desarrollo intracelular de la coccidia, debido principalmente a la vacuolización del retículo endoplasmático, disminuyendo la división nuclear.

Coxizuril 2.5% actúa contra todas las etapas del desarrollo de la coccidia, interfiere la división del núcleo del protozooario, afecta la actividad de las mitocondrias y daña a los corpúsculos que forman la pared en los microgametos.

Por todo ello Coxizuril 2.5% es un Coccidicida eficaz ya que destruye los parásitos en las diferentes etapas de su desarrollo.

### DOSIS:

La dosis recomendada de toltrazuril en aves es de 7 mg/Kg de peso vivo.

#### Tratamiento preventivo:

Aplicar 1 mL de Coxizuril 2.5% por cada litro de agua de bebida durante 48 horas ó bien 3 mL de Coxizuril 2.5% por cada litro de agua de bebida durante 8 horas por 2 días consecutivos, aplicar entre los 10-18 días de edad.

#### Tratamiento curativo:

Aplicar 1 mL de Coxizuril 2.5% por cada litro de agua de bebida durante 48 horas, repetir el tratamiento a los 5 días a criterio del Médico Veterinario

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral disuelto en agua de bebida.

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA:**

Coxizuril 2.5% es compatible con medicamentos, aditivos y otros anticoccidianos utilizados frecuentemente en la producción avícola.

No interviene con la absorción de nutrientes, por lo que no es necesario realizar modificaciones a la fórmula.

No afecta la pigmentación de las aves, por el contrario, favorece en casos de coccidiosis subclínica.

Una vez hecha la solución, Coxizuril 2.5% es estable a temperatura ambiente por lo menos durante 48 horas.

Precipitaciones del ingrediente activo pueden ocurrir cuando el agua contiene grandes concentraciones de Calcio y Magnesio.

**ADVERTENCIAS:**

No se debe consumir la carne de animales tratados con éste producto hasta 16 días después de la última aplicación. (14 días en pavos).

No se administre este producto a aves en producción de huevo destinado al consumo humano.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

Almacénese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.

Una vez diluido en agua de bebida, manténgase protegido de la luz.

**PRESENTACIONES:**

1 Litro.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO****SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA****USO VETERINARIO**